

PALFORZIA®

Guida alla riduzione dei rischi associati al medicamento e al suo utilizzo, per pazienti e caregiver

Consultare anche l'informazione professionale di PALFORZIA®
(allergeni dell'arachide [*Arachis hypogaea*])

▼ Questo medicamento è sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò consente una rapida identificazione delle nuove conoscenze in materia di sicurezza. Chi esercita una professione sanitaria è invitato a segnalare un nuovo o serio effetto collaterale sospetto. Per indicazioni a proposito della segnalazione di effetti collaterali consultare l'ultima pagina.



Aree terapeutiche:

PALFORZIA® può essere utilizzato in pazienti tra i 4 e i 17 anni di età con diagnosi confermata* di allergia alle arachidi clinicamente rilevante per aumentare la dose limite tollerata di arachidi senza comparsa di reazioni allergiche.

Il trattamento con PALFORZIA® può eventualmente essere proseguito nei pazienti di 18 anni o più.

PALFORZIA® deve essere utilizzato unicamente come misura integrativa di un'alimentazione priva di arachidi.

Per ulteriori informazioni consultare l'informazione professionale di PALFORZIA® sul sito www.swissmedicinfo.ch

* Affinché la diagnosi sia confermata devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- Anamnesi di reazioni allergiche alle arachidi
- Conferma di una sensibilizzazione specifica (IgE e/o prick test cutaneo)
- Reazione ad un test di provocazione orale con una dose limite ≤ 300 mg di proteine di arachidi o conferma di una sensibilizzazione forte e conclusiva.

Informazioni su questa guida

A suo figlio è stato prescritto PALFORZIA®: questa guida ha lo scopo di fornire importanti avvertenze di sicurezza per il trattamento con PALFORZIA®. La guida va letta insieme al foglietto illustrativo annesso alla confezione di PALFORZIA® di Suo figlio.

Guide e video per i bambini

È disponibile una serie di guide su PALFORZIA® adatte all'età, che Suo figlio può leggere con o senza il Suo aiuto. È disponibile anche una serie di video a cui accedere scansionando il codice QR qui sotto o visitando il sito Internet seguente:

<https://www.stallergenesgreer.ch/unsere-produkte/palforzia-risikomanagementplan>



Suggerimento:

Per aprire il link tenga la fotocamera del cellulare sopra il codice QR.

1	Riassunto delle avvertenze di sicurezza	5
2	Alcuni aspetti importanti da ricordare	9
3	Informazioni su PALFORZIA®	16
4	Altre istruzioni pratiche	26

1

Riassunto delle avvertenze di sicurezza

Riassunto delle avvertenze di sicurezza

È fondamentale che legga e comprenda le informazioni seguenti e che le spieghi a Suo figlio. Se ha domande, non esiti a chiedere al Suo medico. PALFORZIA® è un medicamento contro l'allergia alle arachidi e, come tutti i medicinali, può avere effetti collaterali. Questa guida contiene informazioni importanti su come assumere il medicamento in sicurezza. Prima di entrare nei dettagli, però, è necessario spiegare due possibili effetti collaterali che potrebbero verificarsi con PALFORZIA®: **una grave reazione allergica e un'infiammazione dell'esofago.**

Per ridurre al minimo il rischio di una reazione, Lei e suo figlio dovete sapere:

- a quali sintomi fare attenzione;
- quando rivolgersi al medico o ai servizi d'emergenza;
- quali sono le cose importanti da fare o da evitare durante il trattamento.

Reazioni allergiche gravi (anafilassi)

Reazioni allergiche gravi (anafilassi) possono interessare diverse parti del corpo contemporaneamente e possono essere pericolose per la vita. Le reazioni possono verificarsi immediatamente o poche ore dopo il contatto con un allergene. L'anafilassi può includere una combinazione dei seguenti sintomi:

- Difficoltà respiratorie
- Sensazione di chiusura della gola o di corpo estraneo nella gola
- Difficoltà a deglutire o a parlare
- Raucedine
- Forti crampi o dolori allo stomaco, vomito o diarrea

Se Suo figlio dovesse manifestare una combinazione di questi sintomi e Lei sospettasse un'anafilassi, proceda con il piano di emergenza per Suo figlio: utilizzi la penna di adrenalina come indicato nelle istruzioni della penna stessa e contatti i servizi di emergenza.

In caso di domande o dubbi sull'uso della penna di adrenalina di Suo figlio, si rivolga al medico, che Le spiegherà come e quando utilizzare la penna.

Infiammazione dell'esofago

In alcune persone con allergia alle arachidi confermata che assumevano un'immunoterapia orale è stata segnalata un'**infiammazione dell'esofago.**

I sintomi dell'infiammazione dell'esofago possono comprendere:

- Difficoltà a deglutire, cibo che rimane in gola, sensazione di bruciore al petto, nella bocca o nella gola, nausea, vomito o eruttazione.

Se Suo figlio manifesta uno di questi sintomi, contatti il medico che lo monitorerà attentamente per l'eventuale presenza di problemi allo stomaco. In caso di sospetto di esofago infiammato il trattamento con PALFORZIA® verrà interrotto.

Altri possibili effetti collaterali:

sensazione di chiusura della gola, vomito, problemi o dolori allo stomaco, malessere, reazioni allergiche (lievi, moderate o gravi), tosse, starnuti, irritazione alla gola, formicolio alla bocca o prurito all'interno o attorno alla bocca, eruzioni cutanee, prurito alla pelle, problemi respiratori, respiro sibilante.

Cosa fare e non fare

Per ridurre al minimo il rischio di effetti collaterali, si assicuri che Suo figlio segua le seguenti regole per il trattamento con PALFORZIA®.

✓ Cosa fare



Assumere PALFORZIA® tutti i giorni



Assumere PALFORZIA® con il cibo



Assumere PALFORZIA® all'incirca alla stessa ora (preferibilmente a cena)



Portare sempre con sé la penna di adrenalina

Cosa non fare



NON mangiare arachidi



NON bere alcol nelle 2 ore prima o dopo l'assunzione di una dose



NON assumere PALFORZIA® se Suo figlio non si sente bene



NON praticare sport né fare docce/ bagni caldi subito prima o nelle 2-3 ore dopo l'assunzione di PALFORZIA®



NON assumere PALFORZIA® nelle 2 ore prima di coricarsi



NON ingoiare la capsula e non inalare la polvere

2

Alcuni aspetti importanti da ricordare



X

Anche dopo aver assunto PALFORZIA® **Suo figlio** non deve **mangiare arachidi o cibi contenenti arachidi.**



Suo figlio deve portare **sempre** con sé la penna di adrenalina.




Immagine simbolo



Suo figlio deve assumere il medicamento **tutti i giorni all'incirca alla stessa ora, con cibo.**

Preferibilmente a cena, ma almeno 2 ore prima di coricarsi.

X

Suo figlio non deve ingoiare le capsule di PALFORZIA®. Le capsule e le bustine devono essere aperte e la polvere deve essere mescolata con un cibo né troppo caldo, né troppo liquido.

✓ Ad esempio sono adatti yogurt, purea di mele o budino.

✗ Zuppe e frullati rientrano tra i cibi con cui non si deve mescolare PALFORZIA®.



Alcuni aspetti importanti da ricordare



Si assicuri che suo figlio **non corra forte né pratichi sport** subito prima e nelle 2-3 ore dopo l'assunzione di PALFORZIA®.



Suo figlio **non deve assumere PALFORZIA®** se non si sente bene.



Suo figlio **non deve fare docce calde o bagni caldi** prima o nelle 2-3 ore dopo l'assunzione di PALFORZIA®.



Suo figlio **non deve assumere PALFORZIA®** nelle 2 ore prima di coricarsi.





Alcuni aspetti importanti da ricordare



Con l'alcol la reazione dell'organismo a PALFORZIA® può cambiare.

È importante che ne parli con Suo figlio. Se beve alcol, non deve farlo nelle 2 ore prima o dopo l'assunzione del medicamento.



Durante le mestruazioni (il ciclo) la reazione dell'organismo a PALFORZIA® può cambiare.

Se Sua figlia manifesta sintomi durante le mestruazioni, ne parli subito con il medico che eventualmente modificherà la dose di PALFORZIA®.



Alcuni antidolorifici (come ad es. ibuprofene e Aspirina) possono alterare la reazione dell'organismo a PALFORZIA®.

Pertanto usi particolare cautela nel somministrare a Suo figlio questi medicinali.



Si rivolga al medico di Suo figlio nei casi seguenti:

- **Suo figlio ha una malattia intercorrente (ossia che insorge contemporaneamente, ad es. raffreddore o infezione influenzale)**
- **L'asma di suo figlio peggiora**
- **Suo figlio è molto stressato**
- **Suo figlio avverte una stanchezza insolita o ha dormito male per più giorni**

3

INFORMAZIONI SU PALFORZIA®

Informazioni su PALFORZIA®

Di seguito troverà le risposte ad alcune domande che potrebbe avere riguardo al trattamento di Suo figlio con PALFORZIA®:

❓ Cos'è PALFORZIA® e chi può assumerlo?

PALFORZIA® è un medicamento immunoterapico orale per l'allergia alle arachidi. È un medicamento per bambini e adolescenti tra i 4 e i 17 anni con diagnosi di allergia alle arachidi. Se suo figlio ha iniziato ad assumere PALFORZIA® prima dei 18 anni, potrà continuare l'assunzione anche dopo averli compiuti. PALFORZIA® è una polvere che contiene una piccola quantità ben precisa di proteina dell'arachide. Il medicamento viene somministrato a piccole dosi da mescolare con il cibo e ingerire. La dose viene aumentata gradualmente nel corso di diverse settimane.

❓ Chi non deve assumere PALFORZIA®?

PALFORZIA® non deve essere assunto in presenza dei problemi seguenti:

- Asma grave o incontrollata.
- Anamnesi di infiammazione dell'esofago, altra malattia gastrointestinale eosinofila, malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) cronica, recidivante o grave, sintomi di disfagia o sintomi gastrointestinali recidivanti di eziologia sconosciuta.
- Anamnesi di mastocitosi grave.
- Ipersensibilità verso uno degli eccipienti (ingredienti aggiuntivi) secondo la composizione (cellulosa microcristallina, amido di mais parzialmente pregelatinizzato, biossido di silicio altamente disperso, magnesio stearato).
- Ipertensione arteriosa o malattie cardiovascolari non controllate.
- I pazienti che hanno manifestato anafilassi grave o potenzialmente fatale nei 60 giorni precedenti non devono iniziare il trattamento con PALFORZIA®.

In caso di incertezza o se non ha mai sentito parlare di una di queste malattie, consulti il medico che Le darà spiegazioni più dettagliate.

❓ Per quanto tempo mio figlio deve assumere PALFORZIA®?

Occorre assumere PALFORZIA® ogni giorno per mantenerne l'effetto e la tollerabilità.

I dati di efficacia attualmente disponibili si riferiscono ad un periodo massimo di trattamento con Palforzia® di 24 mesi.

❓ Mio figlio continua ad essere allergico anche quando assume PALFORZIA®?

Sì, continua ad essere allergico alle arachidi, anche se forse non avrà più reazioni allergiche se per sbaglio mangerà un'arachide. PALFORZIA® ha lo scopo di rendere il sistema immunitario di Suo figlio più resistente alle arachidi, ma non guarisce dall'allergia alle arachidi. È importante che Suo figlio continui a prendere PALFORZIA® tutti i giorni per aumentare la dose limite.

COME ASSUMERE PALFORZIA®


🔍 Come e quando mio figlio deve assumere PALFORZIA®?

- Suo figlio deve assumere PALFORZIA® tutti i giorni, all'incirca alla stessa ora. Preferibilmente a cena.
- Non deve ingoiare la capsula né inalare la polvere. Si aprono le capsule e le bustine e si mescola la polvere con un cibo né troppo caldo, né troppo liquido.
- Utilizzi una piccola quantità di cibo che piace a Suo figlio e che può mangiare facilmente in poche cucchiainate. Ad esempio sono adatti yogurt, purea di mele o budino.
- Latte, zuppe e frullati rientrano tra i cibi con cui non si deve mescolare il medicamento.
- Suo figlio non deve mangiare arachidi o cibi che le contengono.
- Deve portare sempre con sé la penna di adrenalina.
- Si assicuri che Suo figlio non corra e non pratichi sport subito prima e nelle 2-3 ore dopo l'assunzione di PALFORZIA®.
- Si assicuri che Suo figlio non faccia bagni caldi o docce calde prima e nelle 2-3 ore dopo l'assunzione di PALFORZIA®.
- Dopo aver assunto PALFORZIA® deve aspettare almeno 2 ore prima di coricarsi.

Ricordi: Suo figlio non deve ingoiare le capsule. Le capsule devono essere aperte e il contenuto deve essere versato e mescolato accuratamente con il cibo.

Le tre fasi del trattamento

Una volta deciso che Suo figlio può iniziare ad assumere PALFORZIA®, il medico avvia la prima di tre fasi posologiche. Ciò avviene in modo da poter aumentare gradualmente nel tempo la quantità di medicamento che Suo figlio assumerà. Nella prima fase, la cosiddetta fase di intensificazione di dose iniziale, Suo figlio assumerà PALFORZIA® in capsule. Nella seconda fase, la cosiddetta fase di somministrazione a dosi crescenti, Suo figlio riceverà PALFORZIA® in capsule fino all'ultimo livello di dose, che viene fornito in bustine. Nella terza fase, la cosiddetta fase di mantenimento, assumerà PALFORZIA® in bustine. In tutte le fasi il contenuto deve essere prelevato dalle capsule o dalle bustine di PALFORZIA® e mescolato con il cibo, in modo che Suo figlio possa ingerirlo.



☰ Fase 1 - Intensificazione di dose iniziale (due giorni)

Quando Suo figlio inizia ad assumere PALFORZIA®, deve recarsi con lui dal medico per due giorni consecutivi.

Giorno 1 - Durata totale approssimativa della permanenza in ambulatorio: 4-5 ore

- Se Suo figlio si sente abbastanza bene da poter iniziare il trattamento, gli viene somministrata una dose di PALFORZIA® ogni 30 minuti fino a raggiungere cinque dosi.
- Le dosi iniziali sono molto piccole, da 0,5 mg, e poi aumentano lentamente fino a 6 mg. Dopo che Suo figlio ha assunto tutte le dosi, il medico controlla se sta bene.
- Se in questa fase compaiono sintomi gravi che richiedono un intervento medico (in particolare la somministrazione di adrenalina), il trattamento con PALFORZIA® viene interrotto.
- Dopo che Suo figlio ha preso la quinta dose, dovete rimanere in ambulatorio per almeno 1 ora in modo che il medico possa assicurarsi che stia bene.
- Se Suo figlio tollera la quarta dose ma non la quinta, può continuare il trattamento ma deve tornare dal medico prima di iniziare la seconda fase del trattamento (somministrazione a dosi crescenti).





Giorno 2 - Durata totale approssimativa della permanenza in ambulatorio: 2 ore

- Se Suo figlio tollera le dosi del giorno 1, dovete tornare in ambulatorio il giorno 2.
- I medici e gli infermieri sottopongono Suo figlio a dei controlli di salute e gli chiedono come si è sentito il giorno precedente, dopo essere tornato a casa. Se si sente bene e i test mostrano buoni risultati, il medico gli somministra una dose di PALFORZIA® da 3 mg e controlla che stia bene.
- Se tollera questa dose, ricevete una fornitura di dosi di PALFORZIA® da 3 mg da portare a casa, sufficiente per due settimane.

- Nelle due settimane successive Suo figlio deve assumere PALFORZIA® a casa una volta al giorno, con cibo.

Quando Suo figlio assume PALFORZIA® a casa, dovete seguire assolutamente le istruzioni a pagina 22. Nel caso Suo figlio non si senta bene o in qualsiasi momento manifesti una reazione allergica, deve dirlo subito. Lei dovrà utilizzare la penna di adrenalina ed eventualmente chiamare i servizi di emergenza. Parli con il medico curante in caso di qualsiasi dubbio.

Ricordi:

-  **Nei giorni in cui Suo figlio si reca dal medico per ricevere una nuova dose, non deve assumere PALFORZIA® a casa.**
-  **Suo figlio deve continuare ad assumere PALFORZIA® tutti i giorni affinché agisca correttamente.**
-  **Inoltre Suo figlio deve continuare ad essere prudente e non mangiare arachidi o cibi che le contengono.**
-  **Deve sempre portare con sé la penna di adrenalina.**

Fase 2 - Somministrazione a dosi crescenti (almeno 22 settimane)

- Dopo due settimane tornerete dal medico il quale verificherà se Suo figlio è pronto per ricevere una nuova dose di PALFORZIA® leggermente superiore.
- **Nei giorni in cui Suo figlio va dal medico non deve prendere la dose di PALFORZIA® a casa.**
- Se il trattamento sta andando bene, il medico gli somministra una nuova dose più forte e lo tiene sotto osservazione per almeno 1 ora o fino a quando non decide che può tornare a casa.
- A casa Suo figlio deve assumere PALFORZIA® tutti i giorni alla stessa ora, preferibilmente alla sera. Dopo due settimane tornate dal medico e, se tutto va bene, Suo figlio riceve una nuova dose leggermente più forte.
- L'assunzione giornaliera a casa prosegue per almeno 22 settimane, durante le quali Suo figlio torna dal medico ogni due settimane. In questo periodo la dose di PALFORZIA® viene aumentata da 3 mg a 300 mg al giorno in 11 livelli di dose.
- Se Suo figlio ha dimenticato una dose, ha avuto una malattia, effetti collaterali o reazioni allergiche, o deve affrontare un periodo particolarmente stressante (come gli esami, ad esempio), il medico può decidere di mantenere o ridurre la dose e controllare dopo due settimane come sta Suo figlio. Ciò consente al suo organismo di abituarsi meglio alla dose. Il medico informerà Lei e Suo figlio nel caso ciò accada.
- Il medico si assicurerà che Suo figlio riceva la giusta dose di PALFORZIA® da assumere ogni giorno a casa fino alla visita medica successiva.



Fase 3 - Terapia di mantenimento

- Quando Suo figlio può assumere in sicurezza la dose giornaliera di mantenimento di 300 mg, significa che ha raggiunto la fase 3.
- **Come sempre, nei giorni in cui Suo figlio va dal medico non deve prendere la dose abituale di PALFORZIA® a casa.**
- Vi viene consegnata una scatola da portare a casa, con la fornitura di bustine da 300 mg di PALFORZIA® sufficiente per un mese. Nella pagina seguente trova le istruzioni su come mescolare PALFORZIA® con il cibo.
- Durante la fase di mantenimento del trattamento il medico di Suo figlio stabilirà con quale frequenza avranno luogo le visite di controllo.
- Dopo l'assunzione della dose tenga Suo figlio sotto controllo per circa 2 ore per assicurarsi che non manifesti i sintomi di una reazione allergica.



Ricordi:



Suo figlio deve continuare ad assumere PALFORZIA® tutti i giorni affinché agisca correttamente.



Inoltre Suo figlio deve continuare ad essere prudente e non mangiare arachidi o cibi contenenti arachidi.



Deve sempre portare con sé la penna di adrenalina.

Mescolare PALFORZIA® CON IL CIBO

- PALFORZIA® viene fornito in capsule o bustine: fino al livello di dose 10 (240 mg) in capsule da 1-100 mg; dal livello di dose 11 (300 mg) in bustina. Tutte le capsule e le bustine contengono PALFORZIA® in polvere che Lei o Suo figlio dovete mescolare con una piccola quantità di cibo.
- Presti attenzione a non mescolare PALFORZIA® con una quantità eccessiva di cibo, affinché Suo figlio possa assumere l'intera dose in poche cucchiainate. Inoltre il cibo non deve essere riscaldato.
- Durante la fase 2 (somministrazione a dosi crescenti) la confezione di PALFORZIA® di Suo figlio è suddivisa in dosi giornaliere composte da una o più capsule. Durante la fase 3 (terapia di mantenimento) la confezione di PALFORZIA® di Suo figlio è suddivisa in dosi giornaliere composte da bustine singole da 300 mg.



- Versi l'intero contenuto della capsula (delle capsule) o della bustina in una scodella con una piccola quantità di cibo morbido e non troppo caldo né troppo liquido (sono adatti yogurt, purea di mele o budino).
- Se utilizza una o più capsule, apra le capsule sul recipiente contenente il cibo e versi il contenuto di ciascuna capsula sul cibo. Se utilizza una bustina, la tenga sul cibo, tagli la parte superiore con le forbici e versi il contenuto sul cibo.



- Mescoli la polvere nel cibo fino a quando non è completamente omogenea e senza grumi.




- Si assicuri che Suo figlio assuma l'intera porzione in cui è stata mescolata la dose di PALFORZIA®.



- Getti la bustina vuota o le capsule vuote nel contenitore dei rifiuti.



- Lavi subito le mani dopo aver maneggiato le capsule o le bustine di PALFORZIA®.



- Se per qualsiasi motivo Suo figlio non può assumere subito la miscela preparata con PALFORZIA® e il cibo, è possibile conservarla in frigorifero per massimo otto ore.
- Se Suo figlio non consuma la dose entro otto ore dalla preparazione, occorre gettarla via e preparare una nuova miscela.

? Cosa accade se mio figlio salta una dose di PALFORZIA®?

Se Suo figlio ha dimenticato una dose, non ne deve assumere una quantità doppia!

Se Suo figlio salta l'assunzione di PALFORZIA® per uno o due giorni, si assicuri che assuma la dose del giorno successivo all'orario abituale.

Se Suo figlio salta l'assunzione di PALFORZIA® per **tre o più giorni**, occorre contattare il medico prima che assuma la dose successiva.

Potrebbe essere necessario che Suo figlio vada dal medico e assuma PALFORZIA® in sua presenza, dopo aver saltato la dose per diversi giorni. Il medico si accerterà che Suo figlio stia bene e che tutto sia a posto.

Comprendere i dosaggi di PALFORZIA®

La fase di somministrazione a dosi crescenti di PALFORZIA® si compone di 11 livelli.

Ad ogni livello corrisponde un piccolo aumento della dose giornaliera di PALFORZIA®.

Per i primi 10 livelli le dosi sono fornite in capsule di diversa forma, dimensione e colore, contenute in blister separati. Al livello 11 e nella terapia di mantenimento la dose giornaliera è fornita in bustina.

Le immagini mostrano le capsule e le bustine per ciascun livello della fase di somministrazione a dosi crescenti.

È importante annotare il numero di lotto di PALFORZIA®. Perciò ogni volta che riceve una nuova confezione di PALFORZIA® annoti sempre la data e il numero di lotto (che si trova sulla confezione sotto «LOT») e conservi questi dati in un luogo sicuro.

Livello 1

(Dose giornaliera 3 mg)



Livello 2

(Dose giornaliera 6 mg)



Livello 3

(Dose giornaliera 12 mg)



Livello 4

(Dose giornaliera 20 mg)



Livello 5

(Dose giornaliera 40 mg)



Livello 6

(Dose giornaliera 80 mg)



Livello 7

(Dose giornaliera 120 mg)



Livello 8

(Dose giornaliera 160 mg)



Livello 9

(Dose giornaliera 200 mg)



Livello 10

(Dose giornaliera 240 mg)



Livello 11

(Dose giornaliera 300 mg)



4

Altre istruzioni pratiche

Altre istruzioni pratiche

? Dove va conservato PALFORZIA®?

Conservi PALFORZIA® lontano dalla portata dei bambini, in un luogo della Sua casa in cui la temperatura ambiente non superi i 25 °C. Conservi il medicamento in un luogo a temperatura ambiente moderata e non esposto alla luce solare diretta. Un armadio scuro e fresco potrebbe essere la soluzione ideale.

Quando il medico Le comunica che Suo figlio ha completato una fase di somministrazione a dosi crescenti, getti tutte le dosi rimanenti (capsule o bustine) di quella confezione prima che Suo figlio inizi un nuovo livello di dose. Questo vale anche per eventuali dosi aggiuntive incluse in ciascuna confezione che Suo figlio non ha utilizzato.

? Che cosa deve fare mio figlio con la Scheda del paziente?



A Suo figlio sarà consegnata una Scheda del paziente che indica che sta assumendo PALFORZIA®. Sulla scheda dovete scrivere le informazioni di Suo figlio; si assicuri che Suo figlio la mostri a un medico, infermiere o paramedico nel caso debba recarsi da un medico o in ospedale.

? Gravidanza e PALFORZIA®

Le ragazze e le donne non devono iniziare ad assumere PALFORZIA® se sono in gravidanza o stanno pianificando una gravidanza. Se una ragazza o una donna è incinta o sta allattando, o se pensa di poter essere incinta o sta pianificando di avviare una gravidanza, deve chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicamento.

? Mestruazioni e PALFORZIA®

Le mestruazioni possono alterare la reazione dell'organismo a PALFORZIA® e aumentare la probabilità di sintomi allergici.

? Alcol e PALFORZIA®

Il consumo di alcol può aumentare la probabilità di comparsa di una reazione allergica dopo l'assunzione di PALFORZIA®.



Notifica di effetti collaterali

Se nota effetti collaterali, contatti il medico o il farmacista. Ciò vale in particolare anche per gli effetti collaterali non elencati in questo foglietto illustrativo.

STALLERGENES  GREER

Life beyond allergy